

ABENTA™

ADUBOS MINERAIS. SOLUÇÃO DE CÁLCIO COMPLEXADO. LIQUIDO

COMPOSIÇÃO MINIMA GARANTIDA

Cálcio (CaO) total.....2.0% p/p

Cálcio (CaO) solúvel em água.....2.0% p/p

Cálcio (CaO) complexado por ácido cítrico.....2.0% p/p

DOSES E MODO DE EMPREGO

CULTURA	DOSE		RECOMENDAÇÕES
	FOLIAR	FERTIRREGA	
Horticultura em estufa	200-300ml/hl (1-3l/há)	1.5 – 3 l/há	Via foliar: 4 a 5 aplicações uma a cada 8-10 dias. Via radicular: 1 a 3 aplicações cada 7-15 dias nas fases iniciais de cultivo.
Horticultura ao ar livre	250-350ml/hl (1-3l/há)	2-4l/ha	Via foliar: 4 a 5 aplicações uma a cada 8-10 dias. Via radicular: 1 a 3 aplicações cada 7-15 dias nas fases iniciais de cultivo.
Citrinos ou outras árvores de fruto	200-300ml/hl (1-3l/há)	1-3l/há	Via foliar: 2 a 3 aplicações, uma cada 10-15 dias. Na rega: em momentos de stress 2 a 3 aplicações cada 10-15 dias.
Outras culturas extensivas	200-300ml/hl (1-3l/há)	1-3l/ha	Via foliar: 2 a 4 aplicações, uma a cada 6-10 dias. Via radicular: 1-3 aplicações cada 7-15 dias. Nas fases iniciais do cultivo

PRECAUÇÕES

P102 manter fora do alcance das crianças.

P270 Não comer, beber nem fumar durante a sua aplicação.

P401 Armazenar afastado de alimentos e rações.

P403 + P235 Armazenar num lugar bem ventilado e fresco.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de gestão autorizado.

ADVERTÊNCIA

As recomendações e informações que fornecemos são o resultado de estudos e provas extensivas e rigorosas. No entanto, muitos factores fora do nosso controlo (diferentes espécies

e variedades de culturas, preparação de misturas, aplicação, climatologia, estado fenológico da cultura, etc) podem influenciar os resultados, por isso é sempre recomendável realizar um teste prévio na cultura. A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficiência, toxicidade, resíduos, etc.) pela absorvência total ou parcial das instruções do rótulo.

Os recipientes vazios e as embalagens devem ser eliminados de acordo com a legislação nacional vigente.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E USO

Evitar a exposição solar directa e manter entre 5 e 50°C. utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade. Não ultrapassar as doses recomendadas