

Sabre[®] M

Pó molhável com 64% (p/p) de mancozebe e 8% (p/p) de metalaxil

Fungicida sistémico para o combate dos míldios da videira, batateira, tabaco, meloeiro e pepino

Este fungicida contém mancozebe (pertencente ao grupo dos ditiocarbamatos) e metalaxil (pertencente ao grupo das fenilamidas)

Autorização provisória de venda n.º 3923 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A USO PROFISSIONAL

EUH401: PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

P102: MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Capacidade embalagens: 250 g / 20 kg

Um produto:

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÈS, S.A.
División Agricultura
Av. Rafael Casanova 81
08100 Mollet del Vallès
(Barcelona) ESPAÑA

Distribuído por:

JOVAGRO, S.A.
Zona Industrial de Tabueira
Apartado 3132 EC
3801-101 AVEIRO
T- 234 343 300
F – 234 343 303

FUNGICIDAS

FICHAS TÉCNICAS IQV, S.A.

APLICAÇÕES, CONCENTRAÇÕES E ÉPOCA DE APLICAÇÃO

Utilizar **Sabre®m** nos primeiros tratamentos contra o **míldio em videira, tabaco, batateira, meloeiro e pepino**.

Míldio da videira: 250 g/hl. Realizar os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço de Avisos. Na sua ausência iniciar as aplicações ao aparecimento dos primeiros focos da doença ou no estado 7-8 folhas até ao bago grão de chumbo. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. **Não efectuar mais de 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas.** Se necessário, prosseguir os tratamentos com fungicidas com diferente modo de acção.

Míldio da batateira: 250 g/hl. As aplicações devem ser feitas de acordo com o Serviço de Avisos, quando existam. Na sua ausência iniciar os tratamentos quando as condições forem favoráveis à doença. O produto destina-se a ser usado no período de maiores crescimentos da planta, ou seja até à floração **não efectuando mais de 2 aplicações com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas.** A persistência do tratamento é de 10 a 12 dias sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco. Os outros tratamentos a efectuar em condições favoráveis à doença devem ser realizados com fungicidas com outro modo de acção. Após o último tratamento com **Sabre®m** o intervalo entre tratamentos deve ser de 10 dias se utilizar um fungicida não curativo.

Míldio do tabaco: Em viveiros: Fazer um tratamento um a dois dias antes da transplantação. Usar o produto à razão de 25-30 g por 100 m².

No local definitivo: Fazer um tratamento 15-20 dias depois da transplantação na concentração de 250 g/hl.

Não efectuar mais que 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas (1 em viveiro e 1 em local definitivo).

A persistência biológica do produto é de 10 a 12 dias.

Míldio do meloeiro e pepino: 250 g/hl. Fazer os tratamentos preventivamente quando as plantas atinjam o estado de 3-4 folhas verdadeiras ou imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas do míldio. **Efectuar no máximo 2 tratamentos por campanha, com Sabre®m ou com outro fungicida do grupo das fenilamidas.**

Não se deve aplicar Sabre®m nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicações repetidas do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (fenilamidas).

Alternar o uso de produtos com fungicidas de diferente modo de acção.

modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

Evitar deixar a calda em repouso.

Modo de aplicação

A concentração atrás indicada refere-se a pulverizações a alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada de tal modo que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.

FUNGICIDAS

FICHAS TÉCNICAS IQV, S.A.

precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais



Atenção

- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
- Evitar respirar as poeiras e o aerossóis.
- Usar luvas de borracha nitrílica e macacão.
- Se entrar em contacto com a pele: Lavar com sabonete e água abundantes.
- Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.
- Intervalo de Segurança - 3 dias em meloeiro e pepino; 14 dias em batateira; 28 dias em tabaco e em videira de uvas de mesa; 56 dias em videira de uvas para vinificação.
N.º máximo de aplicações com mancozebe: 5 em meloeiro e pepino. Não efectuar mais aplicações com produtos que contenham outras substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame ou zirame), autorizados para a cultura.
- Tratamento de emergência – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente), consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. N.º de telefone de emergência C.I.A.V.: 808 250 143.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente

FUNGICIDAS



AS TÉCNICAS IQV, S.A.

esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Sabre[®]m é marca registada da Industrias Químicas del Vallès, S.A., Espanha

FUNGICIDAS